

ПРОФИЛАКТИКА КОРИ



Корь - острая вирусная инфекционная болезнь с воздушно-капельным путем передачи возбудителя инфекции. Восприимчивость к кори очень высокая, поэтому любой контакт с больным человеком приводит к заражению. Заражаются все контактные (дети и взрослые) не имеющие иммунной защиты против кори. Источником инфекции является больной человек, который выделяет вирус при чихании, кашле с капельками слюны

Характерными симптомами кори являются:

- кашель и/или насморк, конъюнктивит;
- повышение температуры тела до 38 град. С и выше;
- поэтапное высыпание пятнисто - папулезной сливной сыпи с 4 - 5 дня болезни (1 день - лицо, шея; 2 день - туловище; 3 день - ноги, руки) и пигментация.

Заболевание может протекать в тяжелой форме, особенно у не привитых лиц, может осложняться пневмонией, энцефалитом, отитом, ларингитом, стоматитом, кератитом и другими.

Источником инфекции является больной человек с последнего дня инкубационного периода. Корью болеют только люди. Особенно заразны больные в катаральном периоде болезни - в первые 4-5 дней периода высыпаний.

Профилактика кори:

На сегодняшний день единственное средство защиты против кори – вакцинация.

В России иммунизация проводится в рамках Национального календаря профилактических прививок:

- дети должны получить первую прививку против кори (вакцинацию) в 12 месяцев, вторую прививку (ревакцинацию) – в 6 лет;
- взрослые до 35 лет, не привитые ранее, не имеющие сведений о профилактических прививках против кори и не болевшие этой инфекцией ранее, должны быть привиты двукратно с интервалом не менее 3 месяцев.



Прививки проводятся бесплатно в прививочных кабинетах лечебных учреждений по месту жительства.

Жители области, которые отказались от иммунизации, должны осознавать ответственность не только за свое здоровье, но и за здоровье окружающих.

В целях предупреждения «завоза» кори на территорию Иркутской области рекомендуем лицам, выезжающим на отдых в страны Европейского региона, Китай, не болевшим корью, не привитым против кори или имеющим одну прививку против кори:

- Провести профилактическую вакцинацию против кори не менее, чем за 10 дней до отъезда. Прививки против кори проводят в лечебно- профилактических учреждениях по месту жительства.
- После возвращения с отдыха и при появлении признаков недомогания, повышенной температуры тела и т.д. незамедлительно обратиться за врачебной помощью в лечебное учреждение по месту жительства.